

Brutvogel-Kartierung 2024

Nachgewiesene wertgebende Brutvogelarten

Au	Austernfischer	(<i>Haematopus ostralegus</i>)
Bk	Braunkehlichen	(<i>Saxicola rubetra</i>)
Bp	Baumpieper	(<i>Anthus trivialis</i>)
Brg	Brandgans	(<i>Tadorna tadorna</i>)
Bs*	Buntspecht	(<i>Dendrocopos major</i>)
D*	Dohle	(<i>Coloeus monedula</i>)
Ev	Eisvogel	(<i>Alcedo atthis</i>)
Fe	Feldspiegel	(<i>Passer montanus</i>)
Fl	Feldlerche	(<i>Alauda arvensis</i>)
Frp	Flussregenpfeifer	(<i>Charadrius dubius</i>)
G	Goldammer	(<i>Emberiza citrinella</i>)
Gg	Gartengrasmücke	(<i>Sylvia borin</i>)
Gp	Gelbspötter	(<i>Hippolais icterina</i>)
Gr	Gartenrotschwanz	(<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)
Gra	Graugans	(<i>Anser anser</i>)
Gr	Graureiher	(<i>Ardea cinerea</i>)
Gs	Grauschnapper	(<i>Muscicapa striata</i>)
Gü	Grünspecht	(<i>Picus viridis</i>)
Ha	Habicht	(<i>Accipiter gentilis</i>)
Hb	Hühnerfink	(<i>Linnaria cannabina</i>)
Hot*	Hohлтаube	(<i>Columba oenas</i>)
Kch	Kranich	(<i>Grus grus</i>)
Ko*	Kormoran	(<i>Phalacrocorax carbo</i>)
Kra	Kolkrähe	(<i>Corvus corax</i>)
Ks	Kleinspecht	(<i>Dryobates minor</i>)
Ku	Kuckuck	(<i>Cuculus canorus</i>)
M	Mehlschwalbe	(<i>Delichon urbicum</i>)
Mb	Mäusewärd	(<i>Bubo bubo</i>)
N	Nachtgall	(<i>Luscinia megarhynchos</i>)
Nt	Neuntöter	(<i>Lanius collurio</i>)
P	Pfaff	(<i>Ortus oriolus</i>)
Re	Rebhuhn	(<i>Hirundo rustica</i>)
Rm	Rotmilan	(<i>Milvus milvus</i>)
Ro	Rohrhammer	(<i>Emberiza schoeniclus</i>)
Row	Rohrweihe	(<i>Circus aeruginosus</i>)
Ra	Rauchschwalbe	(<i>Hirundo rustica</i>)
S	Star	(<i>Sturnus vulgaris</i>)
Sp	Sperber	(<i>Accipiter nisus</i>)
Sep	Schwarzspecht	(<i>Dryocopus martius</i>)
St	Schafstelze	(<i>Motacilla flava</i>)
Sti	Stieglitz	(<i>Carduelis carduelis</i>)
Stm	Sturmmöwe	(<i>Larus canus</i>)
Sto	Stockente	(<i>Anas platyrhynchos</i>)
Sum	Sumpfseise	(<i>Poecetes palustris</i>)
Swk*	Schwarzkehlchen	(<i>Saxicola rubicola</i>)
T	Teichrohrsänger	(<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)
Tu	Turmfalke	(<i>Falco tinnunculus</i>)
Ts	Trauerschnäpper	(<i>Ficedula hypoleuca</i>)
U	Uferschwalbe	(<i>Riparia riparia</i>)
Uh	Uhu	(<i>Bubo bubo</i>)
W	Wespenpieper	(<i>Articus pratensis</i>)
Was	Waldschnef	(<i>Scotopax rusticola</i>)
Wh	Wendehals	(<i>Jynx torquilla</i>)
Wls	Waldläusänger	(<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)
Wm	Weidenmiese	(<i>Poecetes montanus</i>)
Wt	Weißstorch	(<i>Ciconia ciconia</i>)
Wsb	Wespenbussard	(<i>Pernis apivorus</i>)

* wertgebende Arten aufgrund ihrer habitatspezifischen Ansprüche

Status der Nachweise

- Brutnachweis
- Brutverdacht
- Brutzeitfeststellung
- Großrevier (entspricht nicht dem Brutstandort)
- Nahrungsgast

Brutvogel Funktionsräume (BV01 - BV17, MK20)**


Wertstufe / Bedeutung

- hoch / regional
- mittel / lokal
- gering / sonstige
- sehr gering / keine

** Fachgutachterliche Bewertung der Funktionsräume
Bedeutung der Funktionsräume nach BEHM & KRÜGER 2013

Sonstige Informationen

- Untersuchungsgebiet
- Planung Trassenverlauf OU Elstorf



B3 - OU Elstorf mit Zubringer A 26

Faunistische Untersuchungen
Brutvogelerfassung 2024

Karte 3

Im Auftrag von




bosch & partner

Bosch & Partner GmbH
Lortzingstraße 1
30177 Hannover

Ökoplan Institut für ökologische Planungshilfe

Hochkirchstr. 8
D-10829 Berlin

Fon: 030-4621765
Fax: 030-4606620
oekoplan-brandenburg@t-online.de



Februar 2025

Bearb.: H. Pelny

Geogr.: C. Warmuth
S. Conrad

1:10.000

0 125 250 500 750 1.000
Meter

Quelle : Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung



© 2015